図説 COVID-19流行下の市民による一次救命処置の要点

日常からの感染防護

- 普段からマスクを装着しておく。

反応の確認と通報

- 肩を叩きながら大声で呼びかける。
- 応答や目的のある仕草がなければ、119番。
- ハンズフリー(スピーカー)モードを活用。

呼吸の確認

- あまり近づきすぎないように。
- 普段通りの呼吸でなければ心停止。
- 判断に迷う時も心停止と考えて行動する。

エアロゾル飛散の防止

- マスクやハンカチ、タオル、衣服などで倒れている人の鼻と口を覆う。

胸骨圧迫

- 強く、速く、絶え間なく。
- 成人には人工呼吸を行わない。
- 子どもには、できれば人工呼吸も行う。

AEDによる電気ショック

- AEDの指示に従い、電気ショックを行う。

引き継ぎ後の衛生

- 速やかに石鹸と流水で手と顔を十分に洗う。
- 鼻と口にかぶせたハンカチやタオルなどは、直接触れないようにして廃棄する。

図説 医療用COVID-19対応救命処置の要点

COVID-19対応の要点を簡単にまとめた。下記の順番は、必ずしも絶対的なものではない。

Defibrillation AED/除細動器装着

- エアロゾル感染防護の準備ができずCPRを開始できない場合には、まずAED/除細動器を装着
- 適応あれば電気ショックを先に行ってもよい

PPE エアロゾル対応PPEの着用

- N95以上のマスクまたはPAPR
- 眼の保護具
- 手袋
- 液体非透過性ガウンまたはエプロン

Airway seal 気道の密閉(エアロゾル拡散防止)

- BVMにHEPAフィルターまたはウイルス防護力が十分に備わったHMEフィルターを装着
- 両手法で確実に密閉

Circulation 胸骨圧迫

- エアロゾル感染防護(エアロゾル対応PPE着用および気道の密閉)を実施したうえで胸骨圧迫

Breathing 技能と状態に応じた陽圧換気

- BVM換気
- 声門上気道デバイス
- 気管挿管

無断転載を禁ずる

©Japan Resuscitation Council

COVID-19: 新型コロナウイルス感染症, AED: 自動体外式除細動器, PPE: 個人防護具, CPR: 心肺蘇生, PAPR: 電動ファン付呼吸保護具, BVM: バッグ・バルブ・マスク, HEPAフィルター: 高効率微粒子エア・フィルター, HMEフィルター: 湿熱交換器フィルター